

# 定期予防接種一覧

## ロタウイルスワクチン

対象年齢：1価ワクチン…生後6週～24週0日まで

5価ワクチン…生後6週～32週0日まで

(初回接種は生後14週6日までに行う)

接種方法：ワクチンの種類によって、回数が異なります。

ワクチンの種類	接種回数	標準的な接種間隔
1価ワクチン (ロタリックス)	2回	27日以上の間隔を おいて 同一ワクチンを規定回数接種
5価ワクチン (ロタテック)	3回	

## 五種混合ワクチン

五種混合ワクチンは、四種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ）にヒブワクチンを加えた新しいワクチンです。

原則として、令和6年4月以降に、はじめてワクチンを接種する生後2ヵ月以降のお子さんが五種混合ワクチンの対象です。

※五種混合ワクチンを接種した場合、四種混合ワクチンとヒブワクチンは不要です。

対象年齢：生後2ヵ月～7歳6ヵ月になる前日まで

(標準的な接種月齢は1期初回接種を生後2ヵ月～7ヵ月)

接種回数	標準的な接種間隔
1期初回 3回	20日から56日までの間隔
1期追加 1回	3回接種終了後、 6ヵ月から18ヵ月の間隔をおく

## 四種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ）

対象年齢：生後2ヵ月～7歳6ヵ月になる前日まで

(標準的な接種月齢は1期初回接種を生後2ヵ月～11ヵ月)

接種回数	標準的な接種間隔
1期初回 3回	20日から56日までの間隔
1期追加 1回	3回接種終了後、 12ヵ月から18ヵ月の間隔をおく

## ヒブワクチン

対象年齢：生後2ヵ月～5歳のお誕生日の前日まで  
(標準的な初回接種開始は生後2ヵ月～6ヵ月)

接種方法：初回接種の月齢、年齢によって接種間隔、回数が異なります。

初回接種月齢・年齢	接種回数	標準的な接種間隔
生後2ヵ月～6ヵ月	初回3回	27日以上の間隔 (医師が認める場合は20日以上)
	追加1回	3回目接種後、 7ヵ月から13ヵ月の間隔をおく
生後7ヵ月～11ヵ月	初回2回	27日以上の間隔 (医師が認める場合は20日以上)
	追加1回	2回目接種後、7ヵ月以上
1歳～5歳のお誕生日の前日まで	1回	

## 小児用肺炎球菌ワクチン(20価・15価)

令和6年10月1日から20価小児用肺炎球菌ワクチンが定期接種に追加されます。

それに伴い、13価小児用肺炎球菌ワクチンは定期接種より除外されます。

対象年齢：生後2ヵ月～5歳のお誕生日の前日まで  
(標準的な初回接種開始は生後2ヵ月～6ヵ月・追加接種は1歳～1歳2ヵ月)

接種方法：初回接種の月齢、年齢によって接種間隔、回数が異なります。

初回接種月齢・年齢	接種回数	標準的な接種間隔
生後2ヵ月～6ヵ月	初回3回 (生後12ヵ月までに完了)	27日以上の間隔
	追加1回	3回目の接種後、 60日以上の間隔をおいて、生後 1歳から1歳3ヵ月に至るまで
生後7ヵ月～11ヵ月	初回2回 (生後12ヵ月までに完了)	27日以上の間隔
	追加1回	2回目の接種後、60日以上の間隔 で1歳になってから接種
1歳	2回	1回目から60日以上の間隔
2歳～5歳のお誕生日の前日まで	1回	

## B型肝炎ワクチン

対象年齢：生後2ヵ月～1歳のお誕生日の前日まで(標準的な接種月齢は2ヵ月～9ヵ月)

接種回数	標準的な接種間隔
3回	2回目：1回目から 27日以上の間隔をおく 3回目：1回目から139日以上の間隔をおく

## BCGワクチン

対象年齢：生後3ヵ月～1歳のお誕生日の前日まで（標準的な接種月齢は5ヵ月から7ヵ月）

接種回数
1回

## 麻しん風しんワクチン

対象年齢：1期 1歳～2歳のお誕生日の前日まで  
2期 5歳～7歳未満で、小学校入学前の前年4月1日～3月31日の間に至るまでにある幼児（年長児）

接種回数	
1期 1回	2期 1回

## 水痘(水ぼうそう)ワクチン

対象年齢：1歳～3歳のお誕生日の前日まで

接種回数	標準的な接種間隔
2回	1回目の接種後、 6ヵ月～12ヵ月までの間隔をおく

## 日本脳炎ワクチン（第1期）

対象年齢：3歳～7歳6ヵ月になる前日まで  
（標準的な接種年齢は1期初回接種を3歳、1期追加を4歳）

接種回数	標準的な接種間隔
1期初回 2回	6日から28日までの間隔をおく
1期追加 1回	2回目接種終了後、おおむね1年おく

## 日本脳炎ワクチン（第2期）

対象年齢：9歳～13歳になる前日まで（標準的な接種時期は小学校4年生）

接種回数
1回

## 二種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）

対象年齢：11歳～13歳になる前日まで（標準的な接種時期は小学校6年生）

接種回数
1回